Delir-Schulung

Projekt-Team Delir

Delir = „aus der Spur geraten“

Störung von:

- **Aufmerksamkeit** (Fokussieren, Aufmerksamkeit aufrecht erhalten)
- **Bewusstsein** (somnolent, wach, agitiert)
- **Kognition** (Gedächtnis, Orientierung, Wahrnehmung)

Lässt sich **nicht** durch bekannte neurokognitive Erkrankung erklären

Organische Ursache (Infekt, Operation ...)

Akuter Beginn (Stunden-Tage) und **fluktuierender Verlauf**

Renè Magritte „Le Pelerin“ (1966)

Abhängig von untersuchten Gruppen:

- **Innere Medizin:** ca. 23%
- **Chirurgie:** von 5% nach kleineren Eingriffen – bis zu 50% nach großen Eingriffen (Herzchirurgie)
- **Intensivstation:** 30 – 80%

Die Ursachen eines Delirs sind multifaktoriell

Selbst „Harmlose“ Auslöser können bei Menschen mit hohem Risiko ein Delir auslösen

Ursachen abklären – kausale Therapie prüfen

- D** Drugs: neue Medikamente, Interaktionen, richtige Dosierung?
- E** Elektrolyte: v.a. Hyponatriämie
- L** Lack of drugs: Entzug? (Schlafmittel? Schmerzmittel? Alkohol?)
- I** Infektionen
- R** Reduced sensory input: Brille/Hörgerät vorhanden?
Retentions: Harnverhalt? Obstipation?
- I** Intrakranielle Probleme: Infarkt? Blutung?
- U** „Unter“ (Mangelernährung, Hypovolämie, Hypoxie, Hypoglykämie?)
- M** Myokardiale und pulmonale Erkrankungen (Herzinfarkt, Dekompensation?)

Hohes Risiko

- Anticholinergika
 - Dimenhydrinat (**Vomex**)
 - Promethazin (**Atosil**)
 - Scopolamin (**Buscopan**, Scopoderm)
 - Solifenacin (**Vesikur**), Oxybutinin (Spasyt)
- Parkinsonmedikamente
- Antidepressiva (TCA, SSRI)
- **Benzodiazepine**
- Antihistaminika (H₁- und H₂-Blocker)
- Lithium
- Neuroleptika
- **Steroide**
- Analgetika (**NSAR, Opiate**)
- Antibiotika (**Ciprofloxacin/Levofloxacin**)
- Betablocker, Digitalis, Antiarrhythmika
- Theophyllin
- Antiepileptika

Großer Einfluss auf kurz- und langfristige Prognose

- 20-Tages Mortalität um **20%** erhöht
- 1-Jahres Überlebenschance sinkt mit jedem Delirtag um **10%** (bei Intensivpatienten)
- Krankenhausaufenthalt verlängert sich um ca. **10 Tage**
- Dauerhafte kognitive Funktionseinschränkungen bei bis **33%**, auch bei Patienten < 50 Jahren
- Erhöhte poststationäre **Pflegebedürftigkeit** und **Institutionalisierung**
- Erhöhte Rate an **Stürzen, Dekubiti, Aspirationen**

1: Sato K et al. *Eur Heart J* 2017, 2: Pisani MA et al. *Am J Respir Crit Care Med* 2009, 3: Pandharipande PP et al. *NEJM* 2013, 4: Cole MG et al. *Age Ageing* 2009, 5: Witlox J et al. *JAMA* 2010

Delir – erkannt...?

- gestörter Tag/Nacht-Rhythmus
- Vegetative Symptome: Schwitzen, Hypertonie, Tachykardie
- **psychomotorische Auffälligkeiten**

DAS DELIR HAT VIELE „GESICHTER“

Hyperaktives Delir

- Motorische Unruhe
- Angst
- Aggressivität
- Halluzinationen
- Tachykardie/Schwitzen

5 %

Mischform

- Wechsel von hyper- und hypoaktiven Phasen
- Häufigste Form

65 %

Hypoaktives Delir

- Antriebslosigkeit
- Apathie
- Bewegungsarmut
- Schlechte Prognose da oft übersehen!

30 %

Akuter Beginn

Fluktuierend

... Gefahr gebannt!

Nicht-pharmakologische Therapie und Prävention ist effektiv

MASSNAHMEN ZUR PRÄVENTION UND THERAPIE EINES DELIRS				
Orientierung <ul style="list-style-type: none"> • Brille/Hörgerät/ Zahnprothese • Uhr/Kalender • Biographie-Blume • Persönliche Gegenstände, Angehörige 	Aktivierung <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisation • Fixierung/Katheter vermeiden • Eigenaktivität fördern • Angehörige einbinden • Bücher/Zeitschriften/Spiele 	Ernährung <ul style="list-style-type: none"> • Dehydratation und Mangelernährung vermeiden • Obstipationsprophylaxe 	Entspannung <ul style="list-style-type: none"> • Routinen erhalten • Licht/Lärmreduktion in der Nacht 	Was kann ich tun? Spiele, Bücher, Kalender u.v.m. findest Du in der „Delir/Demenz - Box“

→ Können ein Delir in 20 – 30% der Fälle verhindern!!

! ABER: Einzelmaßnahmen wirken nicht

→ Umsetzung möglichst vieler Elemente

→ Interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig

Pharmakologisch

Nur wenn Basis-Maßnahmen unzureichend, Eigen- bzw. Fremdgefährdung. Ärztliche Anordnung notwendig.

„off-label“

Enge Indikationsstellung

Niederschwellig:

Thiamin 100 mg/d

Neuroleptika nur bei produktiv-psychotischen Symptomen:

- Risperdal: 0,25 – 0,5 mg (max. 3 mg)
- Quetiapin: (bei M. Parkinson) 12,5 – 25 mg

Wenn Sedierung Haupt-Ziel:

- Melperon: 12,5 – 25 mg
- Pipamperon: 20 – 40 mg
- Benzodiazepine vermeiden

*Pocketcard Delir
Allgemeinstationen*

Ein Delir ist ...

- ... eine akute und fluktuierende Störung von Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Wahrnehmung
- **... ein Notfall !**
 - kann einziges „Symptom“ für zugrunde liegende Erkrankung (z.B. Infekt) sein
 - negative Auswirkungen auf kurzfristige und langfristige Prognose
- ... häufig ! (unerkannt)
 - Erkennung von Menschen mit Risiko und systematisches Screening notwendig
- ... in vielen Fällen vermeidbar

Screening, Prävention und Therapie eines Delirs

- am UKU

Delir – Screening am UKU

Vorbestehender Faktor	+	Auslösender Faktor	=	RISIKO	Prävention
Kognitive Einschränkung Pflegeheimbewohner Delir in Vorgeschichte Alter ≥ 65 Jahre Visus/Hörbeeinträchtigung Depression Mangelernährung Chronischer Alkoholkonsum		Operation > 60 Minuten Infektion Hypo-/Hyperglykämie Fixierung/Verkabelung starke Schmerzen Elektrolytstörung		Sehr hoch	≥ 1 Faktor vorhanden: Nicht-Pharmakologische Basis-Maßnahmen (Rückseite) Delir-Screening (4AT Score) <ul style="list-style-type: none"> • Einmalig bei Aufnahme/Übernahme • Bei auffälligem Verhalten (ohne Risikofaktoren) • Bei Nachweis eines Delirs einmal pro Schicht

aus: Pocketcard Delir Allgemeinstationen

Wer sollte auf ein Delir gescreent/untersucht werden?

- Alter ≥ 65 Jahre
- vorbestehende und auslösende Risikofaktoren, die mit einem sehr hohen Risiko für ein Delir verbunden sind („**Rote Karte**“)
- Auffälliges Verhalten (Verwirrtheit, gestörter Tag-Nacht Rhythmus, Halluzinationen, Somnolenz)
- Bei Nachweis eines Delirs: 1x/Schicht

Delir – Screening am UKU: 4AT Score

4 AT – Score

1) Wachheit: auch bei schlafenden/schwer erweckbaren/hyperaktiven Patienten. Fragen Sie z.B. nach Name/Adresse	
• Normale Reaktion (komplett aufmerksam, nicht agitiert)	0
• Weniger als 10 Sekunden schläfrig, dann normal	0
• Deutlich unnormale Reaktion	4
2) Orientierung: Korrekte Nennung von Alter, Geburtsdatum, aktuellem Ort (Name Klinik, Gebäude), Kalenderjahr	
• Fehlerfrei	0
• 1 Fehler	1
• ≥ 2 Fehler	2
3) Aufmerksamkeit: „Nennen Sie mir die Monate eines Jahres rückwärts, beginnend mit Dezember“	
• Nennung von 7 oder mehr Monaten in korrekter Reihe	0
• Beginnt, erreicht aber nicht 7 Monate, keine Compliance	1
• Nicht durchführbar (sediert, fehlende Wachheit, Unwohlsein)	2
4) Akute oder fluktuierende Symptomatik: Hinweis auf deutliche Änderung oder wechselnde Symptome bezüglich Wachheit oder Wahrnehmung (z.B. Halluzinationen) die innerhalb 2 Wochen begannen und in den letzten 24h noch bestanden.	
• Nein	0
• Ja	4

4AT-SCORE _____

- ≥ 4 Punkte: Delir möglich (**zuständige/n Arzt/Ärztin informieren!**)
- 1-3 Punkte: Mögliche kognitive Beeinträchtigung
- 0 Punkte: Delir oder schwere kognitive Beeinträchtigung unwahrscheinlich

4 x „A“: **A**lertness (Wachheit), **A**bbreviated Mental Test (Orientierung), **A**ttention (Aufmerksamkeit), **A**cute change (Fluktuation)

Delir – Screening in SAP: Delir-Ampel im Überblick

Pfl. OE	Zimmer	Bett	Studie	Fach. OE	ePA Ges	Patient/Geschl./Alter	Fall	Aufklärung	Biobank	Delir	PP	R	GebDatum
CG5	5.061	5.061T		IDE									
CG5	5.062	5.062F		GEFACH	●	Braun Ben (M, 39)	10016826			■			15.02.1985
CG5		5.062T		CHIR.I	●	Gimpel Gerlinde (W, 68)	10011198			▲			12.03.1956
CG5		5.063T		CHIR.I	●	Wagnertest123 Jana (W, 33)	10011998		●	●			03.12.1991

Alter $\geq$ 65 Jahre: „Ampel“ gelb = erhöhtes Risiko

Alter < 65 Jahre: „Ampel“ grün = geringeres Risiko

Delir – Screening → **Delir möglich!**

Hinweis: bei auffälligem Verhalten, vielen Risikofaktoren („Rote Karte“) auch bei „grüner Ampel“ Screening durchführen!

Delir – Screening in SAP: Delir- Score anlegen

Pfl. OE	Zimmer	Bett	Studie	Fach. OE	ePA Ges	Patient/Geschl./Alter	Fall	Aufklärung	Biobank	Delir	PP	R	GebDatum
CG5	5.061	5.061T		IDE									
CG5	5.062	5.062F		GEFACH	●	Braun Ben (M, 39)	10016826			■			15.02.1985
CG5		5.062T		CHIR.I	●	Gimpel Gerlinde (W, 68)	10011198			▲			12.03.1956
CG5		5.063T		CHIR.I	●	Wagnertest123 Jana (W, 33)	10011998		●	●			03.12.1991

📄 Aktion auswählen
✕

Delir Score anlegen

Delir Scores anzeigen

"Maßnahme durchgeführt"-Kennzeichen setzen/zurücksetzen (M)

"CAM-ICU durchgeführt"-Kennzeichen setzen/zurücksetzen (C)

Delir – Screening in SAP: Delir- Score anlegen

Dokument anlegen: Verwaltungsdaten

Dokument

Dokumentart Dokumentstatus

Dokumenttyp 4AT Delir Score Version

Dokumentdatum

Beschreibung

Zuordnungen

Dokument. OE CG5

Verantw.MA Dr. med. univ. Bauer Siegfried

Patient Gimpel, Gerlinde

Fall

Bezugsebene BezEbUnikat

Bewegungen/ Leistungen

Be...	Bewegungsart	Datum	Zeit	LeistungNr	Leistung	Leistung-Bez
			00:00:00			
			00:00:00			
			00:00:00			
			00:00:00

4AT Delir Score anlegen: G... 5

Menü Speichern und freigeben

4AT Delir Score anlegen: G.Gimpel, Status: IA

Gimpel, Gerlinde,(W,68),12.03.1956

Fall: 10011198 Station: CG5 Bett: 5.062 Bett an der Tür Risikofaktor: Keine Risikofaktoren gefunden
 Aufnahme: 21.06.2021 Allergien: Allergiedokumentation fehlt
 Fachliche OE: CHIR.I

Skala Information

Skala Bezeichnung	4AT Delir Score	
Datum	10.02.2025	15:23:42
Durchgeführt von	105743	Beck Holger

Wachheit 1

Keine Angabe
 +0 Normale Reaktion (komplett aufmerksam, nicht agitiert)
 +0 Weniger als 10 Sekunden schläfrig, dann normal
 +4 Deutlich unnormale Reaktion

Dieser Punkt soll auch bei schwer erweckbaren, schläfrigen oder agitierten/hyperaktiven Patienten angewendet werden. Beobachten Sie den Patienten. Wenn sie/er schläft, versuchen Sie sie/ihn durch Ansprache oder durch eine Berührung an der Schulter aufzuwecken. Fragen Sie etwa nach dem Namen und der Adresse, um die Beurteilung zu erleichtern.

Orientierung 2

Keine Angabe
 +0 Fehlerfrei
 +1 Ein Fehler
 +2 Zwei oder mehr Fehler

Korrekte Nennung von Alter, Geburtsdatum, aktuellem Ort (Name der Klinik, des Gebäudes), aktuellem Kalenderjahr.

Aufmerksamkeit 3

Keine Angabe
 +0 Nennung von 7 oder mehr Monaten in korrekter Reihe
 +1 Beginnt, erreicht aber nicht 7 Monate, keine Compliance
 +2 Nicht durchführbar (sediert/fehlende Wachheit,Unwohlsein)

Fordern Sie den Patienten auf: „Nennen Sie mir die Monate eines Jahres rückwärts, beginnend mit Dezember.“ Zum Verständnis der Aufgabe ist als Hilfestellung die Frage „Welcher Monat kommt vor dem Dezember?“, etc., erlaubt.

Akute oder Fluktuierende Symptomatik 4

Keine Angabe
 +0 Nein
 +4 Ja

Hinweis auf deutliche Änderung oder wechselnde Symptome bezüglich Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung, (z.B. auch Halluzinationen) die innerhalb der zwei Wochen begannen und in den vergangenen 24 Stunden noch bestanden.

Skala Ergebnis

Score

Delir – Screening in SAP: Delir- Score anlegen

Bei Hinweis für Delir: rote „Ampel“

Pfl. OE	Zimmer	Bett	Studie	Fach. OE	ePA Ges	Patient/Geschl./Alter	Fall	Aufklärung	Biobank	Delir	PP	R	GebDatum	WAuf	Freitext	Diagnose
CG5	5.061	5.061T		IDE												
CG5	5.062	5.062F		GEFACH	●	Braun Ben (M, 39)	10016826			■			15.02.1985			Nicht näher bezeichneter I
CG5		5.062T		CHIR.I	●	Gimpel Gerlinde (W, 68)	10011198			●			12.03.1956			
CG5	5.063	5.063F		IDE												

Skala Ergebnis

Score DELIR wahrscheinlich: Arzt informieren Basismaßn.

≥ 4 Punkte → Delir wahrscheinlich

< 4 Punkte: Delir unwahrscheinlich, ggfs. Re-Evaluation

Maßnahmen zur Prävention und Therapie eines Delirs auf Allgemeinstationen für das ärztliche, pflegerische und therapeutische Personal

Nicht-Pharmakologisch = Basis-Maßnahmen

AUSLÖSER

- Erkennen und behandeln
- Untersuchung/Anamnese
- Labor/ggfs. Bildgebung
- Schmerzen → Schmerzbogen

MEDIKATION PRÜFEN

Folgende Medikamente haben ein hohes delirogenes Potential:

- **Anticholinergika**
 - Dimenhydrinat (Vomex)
 - Promethazin (Atosil)
 - Scopolamin (Buscopan)
 - Solifenacin (Vesikur)
 - Oxybutinin (Spasyt)
 - **Benzodiazepine**
 - Antidepressiva (v.a. Trizyklische)
 - Steroide
 - Antibiotika (v.a. **Fluorchinolone**)
 - **Antihistaminika** (Fenistil, Ranitidin)
 - Neuroleptika
 - Antiparkinson-Medikamente
- Indikation und Dosis prüfen, ggf. absetzen/ersetzen/Dosis anpassen

ORIENTIERUNG

- Brille/Hörgeräte
- Uhr/Kalender
- Vertraute Umgebung durch Familienfotos, persönliche Gegenstände
- Zimmerwechsel und häufige Personalwechsel vermeiden
- Angehörigenbesuche
- Biographie-Blume
- Kommunikation anpassen (Orientierung bieten, Maßnahmen erklären)
- Evtl. Begleitung zu Untersuchungen

MOBILISIERUNG

- Postoperative Frühmobilisation
- Sitzende Position (z.B. Querbettstuhl)
- Sturzprophylaxe
- Blasenkatheter, Fixierungen vermeiden/zeitnah entfernen

ERNÄHRUNG

- Dehydratation vermeiden/ausgleichen
- Zahnprothesen einsetzen
- Unterstützung bei Mahlzeiten
- Auf Vorlieben eingehen
- Obstipationsprophylaxe

AKTIVIERUNG

- Zeitschriften, Bilderbücher, Spiele anbieten (Delirbox)
- Angehörige einbinden
- Grüne Damen/Herren (UKU): gruene.damen@uniklinik-ulm.de

ENTSPANNUNG

- Nachruhe ermöglichen
- Licht-/Lärmreduktion
- Auf medizinische/pflegerische Maßnahmen während Schlafenszeit verzichten
- Routinen erhalten
- Falls pharmakologische Therapie notwendig: Melatonin

Delir – Scores als Übersicht im Verlauf

Dokumente
		Beschrbg.	Bem...	Datum	R.	Zeit	OE	VMA	
<ul style="list-style-type: none"> Aktensicht Fallsicht OE bezogen Gesamt Fall 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Gimpel Gerlinde (W, 68) <ul style="list-style-type: none"> digitale Dokumente (4) Skalen (2) <ul style="list-style-type: none"> 4AT Delir Score 4AT Delir Score 			12.03.1956					
			o	10.02.2025		15:35	CG5	BauerS	
			o	10.02.2025		15:23	CG5	BauerS	

Aktion auswählen

- Delir Score anlegen
- Delir Scores anzeigen
- "Maßnahme durchgeführt"-Kennzeichen setzen/zurücksetzen (M)
- "CAM-ICU durchgeführt"-Kennzeichen setzen/zurücksetzen (C)

Delir – Scores als Übersicht im Verlauf

Delir-Ampel: Zusammenfassung

Es besteht ein Delir-Risiko (aufgrund Alter): **gelbe** „Ampel“

Bei Hinweis für Delir im Screening: **rote** „Ampel“

Es besteht kein erhöhtes Delir – Risiko (aufgrund Alter, andere RF nicht berücksichtigt!)

Es besteht kein Hinweis auf Delir im Screening: **grüne** „Ampel“

Delir – Screening: 3x hintereinander 4AT Score $\leq$ 4 Punkte

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Mehr Informationen zu Screening, Prävention und Behandlung eines Delirs finden Sie in roXtra (SOP und Pocketcard), auf der Homepage der „Projektgruppe Delir“ und auf der Lernplattform genially