

Messgröße:

Down-Syndrom Screening im zweiten Trimester (Quadruple-Test)

Beinhaltet folgende Laborparameter:

- Freie β -Kette des HCG-Moleküls (freies HCG) (s. Ersttrimester-Test)
- Pregnancy-associated-plasma-protein A (PAPP-A) (s. Ersttrimester-Test)
- Unkonjugiertes (freies) Östriol
- Inhibin A

Präanalytik:

Probentransport und Abnahme:

Detaillierte Informationen siehe unter [Präanalytik/Entnahmesystem](#) auf der Homepage der Zentralen Einrichtung Klinische Chemie.

Der Test sollte in SSW 11-14 durchgeführt werden.

Erforderliche Angaben:

Schwangerschaftswoche, BIP (biparietaler Durchmesser – der Querdurchmesser des Kopfes des Kindes), Gewicht, Rauchen sowie Vorliegen eines Diabetes Mellitus.

Probenmaterial:

Serum

Vergabe an ein externes Laboratorium. Eine Liste der Unterauftragslabore ist auf Anfrage erhältlich.

Haftungsausschluss

Jegliche Informationen wurden und werden vor ihrer Veröffentlichung mit äußerster Sorgfalt überprüft. Es wird jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen. Haftungsansprüche welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern nachweislich kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die Verwendung und Nutzung der Zusammenstellungen liegt daher alleine im Verantwortungsbereich des Nutzers/der Nutzerin, welche/r das Universitätsklinikum Ulm AöR gegenüber Ansprüchen Dritter schad- und klaglos halten wird (Haftungsfreistellung). Alle Veröffentlichungen sind freibleibend und unverbindlich. Es wird ausdrücklich vorbehalten, Teile der Veröffentlichung oder die gesamte Veröffentlichung ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.