


Maßnahmen bei Wechselwirkungen unter Paxlovid®

(Nirmatrelvir / Ritonavir)

Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie, Universitätsklinikum Heidelberg, in Zusammenarbeit mit der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). V 1.0 – 23.12.21.
Prof. Dr. med. Gerd Mikus, Prof. Dr. med. Walter E. Haefeli, Prof. Dr. rer. nat. Martin Schulz



Bei den folgenden, sehr häufig eingesetzten Arzneistoffen sind nach derzeitigem Kenntnisstand **keine besonderen Maßnahmen** erforderlich:

Allopurinol, Amlodipin, Bisoprolol, Candesartan, Ibuprofen, Levothyroxin, Metamizol, Metformin, Metoprolol, Pantoprazol, Ramipril, Sumatriptan, Tilidin/Naloxon, Torasemid.

Disclaimer: Die AMK, die ABDA und die Abteilung Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie, Universitätsklinikum Heidelberg, übernehmen keinerlei Gewähr für die inhaltliche Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen. Haftungsansprüche gegen die AMK, die ABDA oder die Universität Heidelberg, welche sich auf Schäden infolge der Nutzung dieser Informationen beziehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Im Zweifel sind die Fact Sheets zu Paxlovid® und die Fachinformationen der einzelnen Interaktionspartner zu Rate zu ziehen. Die Herausgeber und Autoren behalten sich vor, die Inhalte dieser Übersicht ohne gesonderte Ankündigung zu aktualisieren.