

# Update Zulassungen

Dr. Valentin Wollenek

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

# Einleitung

- für Kinder und Jugendliche bei psychiatrischen Krankheitsbildern in Österreich
- Quellen
  - Arzneimittelregister – ohne Beachtung von Verfügbarkeiten
  - Huscsava M, Vesely C, Scharinger C, Plener P; Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Review über Psychopharmaka mit Zulassung in Österreich für die Anwendung an Kindern und/oder Jugendlichen. Neuropsychiatr. 2020 Mar;34(1)
- kein Anspruch auf Vollständigkeit
- no conflict of interest

# Überblick

- Antipsychotika
- Antidepressiva
- ADHS-Medikamente
- Benzodiazepine/ Hypnotika/ Sedativa

# Antipsychotika

## Haloperidol

### Tabletten und Lösung

- **ab 6a:** Schwere persistierende Aggression mit Autismus oder tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, wenn andere Therapien versagt haben oder unverträglich sind
- **ab 10a:** Tics einschließlich Tourette-Syndrom bei stark beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen nach Versagen edukativer, psychologischer und anderer pharmakologischer Therapien
- **ab 13a:** Schizophrenie, wenn andere pharmakologische Therapien versagt haben oder unverträglich sind

# Antipsychotika

## Clozapin

### Tabletten

- **ab 16a**: therapieresistente Schizophrenie bei schweren, nicht zu behandelnden neurologischen unerwünschten Reaktionen auf andere Neuroleptika einschließlich eines atypischen Neuroleptikums.

NB: Therapieresistenz = Ausbleiben befriedigender klinischer Besserung trotz Verwendung angemessener Dosen von mindestens zwei verschiedenen Neuroleptika, einschließlich eines atypischen Neuroleptikums, die für eine angemessene Dauer verabreicht wurden.

# Antipsychotika

## Risperidon

Film-, Schmelztabletten, Lösung

**ab 5a** bei anhaltender Aggression bei Pat mit (gemäß DSM IV-Kriterien) diagnostizierter unterdurchschnittlicher Intelligenz

Voraussetzungen:

- Kurzzeitbehandlung (bis zu 6 Wochen)
- nur als Bestandteil eines umfassenden Behandlungsprogramms (inkl. psychosoziale und erzieherische Maßnahmen)
- Empfehlung: Verordnung durch Spezialisten!

# Antipsychotika

## Ziprasidon

Hartkapseln und Suspension

**ab 10a:** manische oder gemischte Episoden mittleren Schweregrades bei bipolaren Störungen

## Aripiprazol

Tabletten und Schmelztabletten

- **ab 13a:** max. 12 Wochen bei mäßigen bis schweren manischen Episoden der Bipolar-I-Störung
- **ab 15a:** Schizophrenie

# Antipsychotika

## Paliperidon

Retardtabletten

**ab 15a:** Schizophrenie

## Sulpirid

Tabletten und Kapseln – nur für Dogmatil®

**ab 6a:** Schizophrenie



# Antipsychotika

## Tiaprid

Tabletten und Ampullen

### **ab 12a**

- Frühdyskinesien, Spätdyskinesien, Chorea Huntington
- psychomotorische Störungen bei chronischem Alkoholismus

# Antipsychotika

## Levomepromazin

Filmtabletten, Tropfen

- Psychosen des schizophrenen Formenkreises
- Reaktive Psychosen mit Angst und Unruhe

„Da **keine ausreichend dokumentierten Daten** zur Dosierung bei Kindern und Jugendlichen vorliegen, ist eine **strenge Nutzen-Risiko-Abwägung** erforderlich; eine etwaige Anwendung darf nur in **Ausnahmefällen unter besonders sorgfältiger (fach)ärztlicher Überwachung** erfolgen. Aufgrund der kognitiven Auswirkungen wird eine **jährliche klinische Untersuchung zur Beurteilung der Lernfähigkeit** empfohlen. Die Dosierung wird regelmäßig an den klinischen Zustand des Kindes bzw. Jugendlichen angepasst. Die Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren ist nur für Ausnahmesituationen in einer speziellen Umgebung vorgesehen.

(...) Die Tagesdosis ist nach Möglichkeit auf 3 Portionen aufzuteilen und darf 37,5 mg pro Tag nicht überschreiten. Jugendliche erhalten die gleiche Dosierung wie Erwachsene.“

# Antidepressiva

## Fluoxetin

Tabletten, Filmtabletten, Kapseln

**ab 8a:** Mittelgradige bis schwere depressive Episoden

- wenn die Depression nach 4 bis 6 Sitzungen nicht auf psychologische Therapiemaßnahmen anspricht
- nur in Verbindung mit einer gleichzeitigen psychologischen Behandlung gegeben werden.

# „Antidepressiva“

Fluvoxamin

Filmtabletten

**ab 8a:** Zwangsstörung für maximal 10 Wochen

Sertralin

Filmtabletten

**ab 6a:** Zwangsstörung

# „Antidepressiva“

## Amitryptilin

Filmtabletten

**ab 6a:** nächtliches Einnässen

- nur wenn organische Ursachen ausgeschlossen wurden und bei Ausbleiben aller anderer medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlungsmaßnahmen.
- nur von Ärzt\_innen, die Erfahrung in der Behandlung von anhaltendem Bettnässen besitzen.

## Clomipramin

Nur Dragees!

**ab 5a:** Zwangsstörung

# Antidepressiva

## Johanniskraut (Hyperici herba)

*Neurapas® Filmtabletten*

### **ab 12a**

- psychische Verstimmungszustände (z.B. einhergehend mit Interessenverlust, gedrückter Stimmung, Antriebslosigkeit)
- nervös bedingte Ein- und Durchschlafstörungen

*Dr. Böhm® Johanniskraut 425 mg-Kapseln*

### **ab 12a**

- seelische Verstimmungszustände, die mit Interessensverlust, gedrückter Stimmung und Antriebslosigkeit einhergehen können

# ADHS - Stimulanzien

## Methylphenidat

Tabletten, Kapseln, Retardtabletten, Hartkapseln

**ab 6a** bei ADHS

Voraussetzungen:

- als Teil einer therapeutischen Gesamtstrategie (psychologische, pädagogische, soziale, pharmakotherapeutische Maßnahmen), wenn andere therapeutische Maßnahmen unzureichend
- von Spezialisten für Verhaltensstörungen angeordnet

# ADHS - Stimulanzien

## Lisdexamfetamin

Hartkapseln

**ab 6a** bei ADHS

Voraussetzungen:

- wie bei Methylphenidat UND
- unzureichende Therapie mit Methylphenidat



# ADHS – Non-Stimulanzien

## Atomoxetin

Hartkapseln

**ab 6a** bei ADHS

Voraussetzungen:

- Behandlung durch Spezialisten
- umfassendes Behandlungsprogramms (inkl. nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Beratungen und Verhaltenstherapie)

# ADHS – Non-Stimulanzien

## Guanfacin

Retardtabletten

**ab 6a** bei ADHS

Voraussetzungen:

- Behandlung mit Stimulanzien unverträglich/ unwirksam o.Ä.
- Teil einer therapeutischen Gesamtstrategie (inkl. psychologische, pädagogische sowie soziale Maßnahmen)

# Benzodiazepine

## Bromazepam

Filmtabletten, Tabletten

### **ab 6a**

- Angst- und Spannungszustände, Nervosität, Erregung, Unruhe
- Ängstliche Verstimmung bei Depressionen
- Adjuvans in der Therapie von Psychoneurosen
- durch Angst/Spannung verursachte funktionelle Störungen (inkl. chronischen Erkrankungen)

Voraussetzung: schwere Erkrankung, starke Beeinträchtigung/ extremer Leidensdruck  
– **nur bei zwingender Indikation!**

# Benzodiazepine

## Diazepam

Rektaltubus

### **ab 1a und 10 kg KG:**

- initiale Behandlung von akuten schweren Angst-, Spannungs- und Erregungszuständen
- Epileptischen Anfälle/ Fieberkrämpfen
- Muskelkrämpfen verursacht durch Tetanus
- Prämedikation vor kleineren chirurgischen oder zahnärztlichen Eingriffen

Tabletten, Ampullen, Tropfen

### **ab 6a** nur bei zwingender Indikation:

- Angst- und Spannungszustände
- kurzfristigen Therapie von Schlafstörung (nur, wenn gleichzeitig eine Wirkung am Tage erwünscht ist)
- Alkoholentzugstherapie
- Spasmen der Skelettmuskulatur

# Hypnotika/ Sedativa

## Diphenhydramin

Lösung **ab 0a**; Ampullen **ab 2a**; Dragees **ab 12a**; Tabletten **ab 16a**

Kurzzeitbehandlung bei Ein- bzw. Durchschlafstörungen

Evaluation d. Indikation nach 2 Wochen notwendig

## Melatonin

Slenyto®: Schlafstörung **ab 2a**

- bei Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und/oder Smith-Magenis-Syndrom **UND**
- wenn Schlafhygienemaßnahmen unzureichend waren

THE CHOICE IS YOURS



**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**